

เอกสารประชาสัมพันธ์

การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

คนไทยน้ำใจสีขาว

ร่วมต้านยาเสพติด



ด้วยความประณานดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

โทร. 056-692111

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

① ป้องกันตนเอง ทำได้โดย...

- ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันยาเสพติด
- ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกซักขวัญ
- เลือกคนเพื่อนที่ดี โดยไม่คบค้าสมาคมกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น
- เมื่อพบว่าตนเองติดยาเสพติดให้รีบปรึกษาครอบครัว หรือ คุณครู อาจารย์ นักพัฒนาชุมชน อบต.กองทุก ทันที โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือมีความผิด เพื่อจะได้ทางแก้ไขและบำบัดรักษาได้ทันท่วงที

② ป้องกันครอบครัว ทำได้โดย...

- สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
- ให้อภัย ให้กำลังใจ และหาหนทางแก้ไขหากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
- สอดส่องให้สมาชิกในครอบครัวเลือกคนที่ดีโดยไม่คบค้าสมาคมกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

③ ป้องกันชุมชน ทำได้โดย...

- สร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อพบผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชนให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ซึ่งหน่วยงานราชการจะปกปิดเป็นความลับเพื่อป้องกันผู้แจ้งไม่ให้ได้รับอันตราย

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

③ ปังจัยตัวยา ได้แก่

- ยาเสพติดจะไปกระตุ้นสมองสร้างสารเคมีที่ทำให้เกิดรู้สึกสุข ซึ่งเป็นการกระตุ้นที่ผิดธรรมชาติ เมื่อหมดฤทธิ์ของยาเสพติด ร่างกายมีอาการหุ่งหดหึง ซึมเศร้า เมื่อใช้ยาเสพติดมากขึ้นสมองจะถูกทำลาย

ความเชื่อที่ผิดๆ ที่ทำให้วัยรุ่นเสพยาบ้า สาใจ

- เชื่อว่าเสพยาแล้วจะผอม หุ่นดี ช่วยลดน้ำหนัก
- เชื่อว่าเสพยาแล้วผิวจะสวย ผิวขาวขึ้น
- เชื่อว่าเสพยาแล้วจะหล่อ จะสวย ไม่มีกลิ่นตัว
- เชื่อว่าเสพยาแล้วจะสมองดี เรียนเก่ง
- เชื่อว่าเสพยาแล้วจะเพิ่มพลังและสมรรถภาพทางเพศ

เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อติดยาเสพติด ??

➤ ไม่รู้สึกอยากอาหารซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำหนักลดลง และเมื่อเลิกเสพน้ำหนักตัวจะขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า Yoyo Affect

- ผัวซึด ผิวแห้ง ตัวคล้ำเมื่อเสพเป็นเวลานาน
- อารมณ์ดี ตื่นเต้นและพูดมาก หลังจากเสพยาไม่กี่นาทีเริ่มยั่วคิดยั่วทำ หูดชา ๆ หัวคระแวง
- รูม่านตาขยาย การมองพร้อมัว เหงื่อออกรามาก วิงเวียน ริมฝีปากแห้ง
- ความตันโลหิตสูงขึ้น ปวดหัวอย่างรุนแรง อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและผิดปกติ มือและนิ้วสั่น
- เข็กสีส้ม หมดความรู้สึกทางเพศ
- อาการประสาทหลอนนำไปสู่โรคค่อนไม่หลับเรื้อรัง สมองทำงานน้อยลง
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นเร็ว และอาจเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้